


63.51



Verzeichnis

über

Blumenzwiebeln u. Knollengewächse


für Wiederverkäufer

von

**H. Gusmus**

Klagenfurt (Oesterreich).

*Austria*



Oignons à fleurs etc. en gros.




Trade List

of

**Bulbs and Roots etc.**

*for dealers*

1891.



## Bemerkungen.

**Die Preise** sind in Reichsmark (M.) deutscher Währung angegeben. 1 M. à 100 Pfennig (dl) = 1 shill. engl. = 1.25 Franc und gelten im Allgemeinen für cultivirte starke Zwiebeln etc. mit Ausnahme derjenigen, welche als Sammelpflanzen mit \* bezeichnet sind.

Preise netto ohne Rabatt. — Ziel drei Monate.

**Briefe**, Correspondenzen, Gelder erwarte franco.

**Correspondenz** deutsch, französisch, englisch.

**Aufträge** werden baldmöglichst erbeten, um sich gute Ware zu sichern, und die Ausführung möglichst complet zu ermöglichen.

**Verpackung** wird mit möglichster Sorgfalt ausgeführt, und nur die Auslagen berechnet; Kisten etc. indess **nicht** zurückgenommen.

**Garantie** wird für Echtheit geleistet; sollten sich Meinungsverschiedenheiten ergeben, so ist der wissenschaftliche Name entscheidend.

**Reclamationen** nur innerhalb acht Tagen vom Tage des Empfanges der Sendung zulässig.

Ich bitte noch besonders beachten zu wollen:

1. den Namen und die Adresse **leserlich** zu schreiben,
2. den Transportmodus angeben zu wollen und Post- oder Eisenbahnstation genau zu bezeichnen. (Viele Aufträge sind wegen Ungenauigkeit der Adresse unerledigt geblieben.)

**Telegramm-Adresse:** „Gusmus, Klagenfurt, Oesterreich.“

Zu den **Hundertpreisen** werden 50 und 25,

zu den **Dutzendpreisen** nur 6 Stück abgegeben.

Die Preise dieser Liste sind nur für Wiederverkäufer giltig.

H. Gusmus, Klagenfurt,  
Oesterreich.

|                                             | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|---------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Aconitum, Ranunculaceae, Aug.—März.</b>  |               |                  |
| Anthora L. . . . .                          | 18            | 2 50             |
| Cammarum Jacq. . . . .                      | 9             | 1 25             |
| cernuum Wulf. . . . .                       | 8             | 1 20             |
| exaltatum Rechb. . . . .                    | 9             | 1 25             |
| hians Rechb. . . . .                        | 9             | 1 25             |
| Lycoctonum L. . . . .                       | 7             | 1 15             |
| moldavicum Hacq. . . . .                    | 12            | 1 80             |
| Napellus L. . . . .                         | 5             | 1 —              |
| paniculatum W. . . . .                      | 8             | 1 20             |
| pyramidale Bernh. . . . .                   | 18            | 2 50             |
| pyrenaicum Lam. . . . .                     | 15            | 2 —              |
| rostratum Rechb. . . . .                    | 12            | 1 80             |
| Stoerkeanum Rechb. . . . .                  | 9             | 1 25             |
| tauricum Rgl. . . . .                       | 10            | 1 50             |
| toxicum Rechb. . . . .                      | 15            | 2 —              |
| variegatum L. . . . .                       | 9             | 1 25             |
| Vulparia Rech. . . . .                      | 12            | 1 80             |
| <b>Acorus, Aroideae, Oct.—April.</b>        |               |                  |
| gramineus Ait. . . . .                      | 25            | 4 —              |
| — fol. variegatis . . . . .                 | 30            | 4 50             |
| japonicus Thbg. . . . .                     | 12            | 1 80             |
| — fol. variegatis . . . . .                 | 20            | 3 —              |
| <b>Adonis, Ranunculaceae, Aug.—März.</b>    |               |                  |
| apennina L. . . . .                         | 40            | 6 —              |
| hybrida Wolf. . . . .                       | 55            | 7 50             |
| pallida hort. . . . .                       | 40            | 6 —              |
| parviflora Janka . . . . .                  | 50            | 7 —              |
| praecox Morr . . . . .                      | 70            | 10 —             |
| pyrenaica DC . . . . .                      | 40            | 6 —              |
| vernalis L. . . . .                         | 10            | 1 50             |
| villosa Ledeb. . . . .                      | 30            | 4 50             |
| wolgensis Stev. . . . .                     | 25            | 3 —              |
| <b>Adoxa, Araliaceae, Aug.—Nov.</b>         |               |                  |
| Moschatellina L. . . . .                    | 4             | — —              |
| <b>Allium, Liliaceae-Asphod. Sept.—Nov.</b> |               |                  |
| albidum Fisch. . . . .                      | 5             | 1 —              |
| amblyophyllum Kar. et Kir. . . . .          | 20            | 3 —              |
| arvense L. . . . .                          | 10            | 1 50             |
| caeruleum Waldst. et Kit. . . . .           | 12            | 1 80             |
| pratense Rgl. . . . .                       | 90            | 12 —             |

|                                         | 100 St. | 12 St. |
|-----------------------------------------|---------|--------|
|                                         | M.      | M. dl. |
| <b>Allium</b>                           |         |        |
| atropurpureum W. et K. . . . .          | 9       | 1 25   |
| carinatum L. . . . .                    | 5       | 1 —    |
| cernuum Roth . . . . .                  | 18      | 2 50   |
| ciliatum Cyr. . . . .                   | 20      | 3 —    |
| coeruleum Herb. . . . .                 | 25      | 4 —    |
| corymbosum hort. . . . .                | 20      | 3 —    |
| danubiale Spr. . . . .                  | 12      | 1 80   |
| fallax Schltz. . . . .                  | 5       | 1 —    |
| flavum L. . . . .                       | 4       | —      |
| flavescens Bess. . . . .                | —       | 5 —    |
| fuscum W. et Kit. . . . .               | 10      | 1 50   |
| giganteum Rgl. . . . .                  | —       | 18 —   |
| globosum M. B. . . . .                  | 9       | 1 25   |
| junceum L. . . . .                      | 5       | 1 —    |
| Ledebourianum Schult. . . . .           | —       | 4 —    |
| montanum Schm. . . . .                  | 10      | 1 50   |
| narcissiflorum Vill. . . . .            | 20      | 3 —    |
| neapolitanum Cyr. . . . .               | 3       | —      |
| nigrum L. . . . .                       | 9       | 1 25   |
| ochroleucum et K. . . . .               | 8       | 1 20   |
| Ostrowskianum Rgl. . . . .              | 35      | 5 —    |
| pallens L. . . . .                      | 18      | 2 50   |
| paradoxum Don. . . . .                  | 35      | 5 —    |
| rotundum L. . . . .                     | 18      | 2 50   |
| roseum L. . . . .                       | 5       | 1 —    |
| saxatile Lor. . . . .                   | —       | 8 —    |
| senescens L. . . . .                    | 12      | 1 80   |
| serotinum W. et K. . . . .              | 18      | 2 50   |
| sibiricum W. . . . .                    | 8       | 1 20   |
| stramineum Rgl. . . . .                 | 30      | 4 50   |
| strictum Schrad. . . . .                | 18      | 2 50   |
| suaveolens Jacq. . . . .                | 30      | 4 50   |
| sub hirsutum Ledd. . . . .              | 9       | 1 25   |
| urceolatum Rgl. . . . .                 | 28      | 4 —    |
| ursinum L. . . . .                      | 3       | —      |
| Victorialis L. . . . .                  | 16      | 2 —    |
| <b>Alstroemeria. Amaryl. Oct.—März.</b> |         |        |
| aurea Grah. . . . .                     | 10      | 1 50   |
| brasiliensis Sello. . . . .             | 16      | 2 —    |
| chilensis. J. Cree . . . . .            | 10      |        |
| peruviana hort. . . . .                 | 18      |        |
| psittacina Lehm. . . . .                | 16      |        |
| sulphurea hort. . . . .                 | —       |        |

|                                              | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|----------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Anemone, Ranuncul., Herbst u. Frühj.</b>  |               |                  |
| apennina L. . . . .                          | 3             | —                |
| — albida hort. . . . .                       | 20            | 3 —              |
| blanda Schott . . . . .                      | 40            | 6 —              |
| coerulea Lam. . . . .                        | 50            | 7 —              |
| coerulescens Hausm. . . . .                  | 30            | 4 50             |
| coronaria L. . . . .                         | 3             | —                |
| fulgens L. . . . .                           | 5             | 1 —              |
| — fl. pleno . . . . .                        | 5             | 1 —              |
| japonica L. . . . .                          | 9             | 1 25             |
| — elegans H. B. . . . .                      | 9             | 1 25             |
| — fl. albo . . . . .                         | 10            | 1 50             |
| nemorosa L. . . . .                          | 3             | —                |
| — rosea . . . . .                            | 6             | 1 —              |
| — fl. albo. . . . .                          | 3             | —                |
| — fl. albo pleno . . . . .                   | 5             | 1 —              |
| — bracteata . . . . .                        | 8             | 1 20             |
| — fl. pleno . . . . .                        | 5             | 1 —              |
| ranunculoides L. . . . .                     | 3             | —                |
| Robertsoni hort. . . . .                     | 30            | 4 50             |
| stellata L. . . . .                          | 3             | —                |
| — rosea. . . . .                             | 5             | 1 —              |
| trifolia L. . . . .                          | 6             | 1 —              |
| <b>Anomatheca, Irideae, Oct.—April.</b>      |               |                  |
| corymbosa Lindl. . . . .                     | 50            | 7 —              |
| cruenta Lindl. . . . .                       | 6             | 1 —              |
| <b>Anthericum, — Lil.-Asphod., Oct.—Apr.</b> |               |                  |
| floribundum Ait. . . . .                     | 50            | 7 —              |
| graminifolium Lindl. . . . .                 | 20            | 3 —              |
| Liliago L. . . . .                           | 10            | 1 50             |
| — major hort. . . . .                        | 15            | 2 —              |
| Liliastrum L. . . . .                        | 10            | 1 50             |
| — major hort. . . . .                        | 20            | 3 —              |
| ossifragum L. . . . .                        | 20            | 3 —              |
| ramosum L. . . . .                           | 6             | 1 —              |
| <b>Antholyza, — Irideae, Sept.—Nov.</b>      |               |                  |
| aethiopica L. . . . .                        | 40            | 6 —              |
| bicolor Gasparini . . . . .                  | 40            | 6 —              |
| Cunonia. hort. . . . .                       | 40            | 6 —              |
| — fol. var. . . . .                          | 40            | 6 —              |
| speciosa hort. Breit. . . . .                | 50            | 7 —              |
| diversae sp. . . . .                         | 9             | 1 25             |
| <b>Anticlea, Colchicaceae, Aug.—Oct.</b>     |               |                  |
| glauca H. B. K. . . . .                      | 50            | 7 —              |

|                                                 | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Aristolochia</b> , Aristolochieae, Oct.—Apr. |               |                  |
| Clematitis L. . . . .                           | 5             | 1 —              |
| longa L. . . . .                                | 25            | 3 —              |
| rotunda L. . . . .                              | 18            | 3 —              |
| <b>Artropodium</b> , Liliaceae-Asphodel.        |               |                  |
| cirrhosum R. Br. . . . .                        | 90            | 12 —             |
| minus R. Br. . . . .                            | —             | 12 —             |
| <b>Arum</b> , Aroideae. Sept.—Nov.              |               |                  |
| albis spathum L. . . . .                        | 18            | 3 —              |
| arisarum Jacq. . . . .                          | 10            | 1 50             |
| Bassi Brew. . . . .                             | 18            | 3 —              |
| canariense hort. Krel. . . . .                  | 50            | 8 —              |
| cornutum hort. Krel. . . . .                    | 10            | 1 50             |
| crinitum Ait. . . . .                           | 50            | 8 —              |
| Dracunculus L. . . . .                          | 12            | 1 80             |
| italicum Mill. . . . .                          | 3             | —                |
| maculatum L. . . . .                            | 5             | 1 —              |
| — immaculatum Rehb. . . . .                     | 10            | 1 50             |
| Malyi Schott. . . . .                           | —             | 10 —             |
| orientale M. B. . . . .                         | 15            | 2 —              |
| proboscidium L. . . . .                         | 30            | 4 —              |
| spectabile Schott. . . . .                      | —             | 15 —             |
| tenuifolium L. . . . .                          | 20            | 3 —              |
| ternatum Thunb. . . . .                         | —             | 12 —             |
| variolatum hort. Krel. . . . .                  | —             | 10 —             |
| viminale Hort. Krel. . . . .                    | —             | 12 —             |
| Zelebori Schott. . . . .                        | —             | 15 —             |
| <b>Asclepias</b> , Asclepiadeae, Oct.—April.    |               |                  |
| tuberosa L. . . . .                             | 25            | 3 —              |
| <b>Asarum</b> , Aristolochieae, Oct.—April.     |               |                  |
| canadense L. . . . .                            | 30            | 4 50             |
| caudatum hort. . . . .                          | 40            | 5 —              |
| europaeum L. . . . .                            | 3             | —                |
| grandiflorum hort. . . . .                      | 40            | 6 —              |
| <b>Asparagus</b> , Asphodeleae, Oct.—April.     |               |                  |
| collinus Schur. . . . .                         | 25            | 3 50             |
| tenuifolius Lam. . . . .                        | 10            | 1 —              |
| <b>Asphodelus</b> , Asphodeleae, Oct.—April.    |               |                  |
| albus Mill. . . . .                             | 40            | 6 —              |
| cerasiferus . . . . .                           | 50            | 8 —              |
| fistulosus Sieb. . . . .                        | 18            | 3 —              |
| lusitanicus Scop. . . . .                       | 30            | 5 —              |
| luteus L. . . . .                               | 10            | 1 25             |
| ramosus Scop. . . . .                           | 18            | 3 —              |

|                                                 | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Babiana</b> , Irideae, Aug.—Oct.             |               |                  |
| var. <i>diversae</i> . . . . .                  | 50            | 8 —              |
| <b>Barnardia</b> , Asphodeleae, Sept.—Nov.      |               |                  |
| scilloides Adams . . . . .                      | 8             | 1 25             |
| <b>Begonia</b> , Begoniaceae, Oct.—Mai.         |               |                  |
| boliviensis A. DC. . . . .                      | 50            | 8 —              |
| Chelsoni hort. . . . .                          | 50            | 8 —              |
| Dawiesi hort. . . . .                           | 50            | 8 —              |
| discolor Sw. . . . .                            | 30            | 4 50             |
| Fröebeli A. DC. . . . .                         | 15            | 2 —              |
| Haageana Rgl. . . . .                           | 50            | 8 —              |
| hybrida hort. . . . .                           | 30            | 4 50             |
| metallica G. Sm. . . . .                        | 50            | 8 —              |
| miniata W. . . . .                              | 50            | 8 —              |
| nitida Dryand. . . . .                          | 30            | 4 50             |
| Sedeni hort. . . . .                            | 30            | 4 50             |
| Schmidtiana Rgl. . . . .                        | 30            | 4 50             |
| Veitchi Lindl. . . . .                          | —             | 30 —             |
| <b>Bloomeria</b> , Irideae, Sept.—Nov.          |               |                  |
| aurea Chat. . . . .                             | 50            | 8 —              |
| <b>Brodiaea</b> , Liliac.-Hemeroc.              |               |                  |
| capitata Lindl. . . . .                         | 30            | 4 50             |
| coccinea A. Gray. . . . .                       | 40            | 5 —              |
| congesta Smith. . . . .                         | 6             | — 75             |
| gracilis DC. . . . .                            | —             | 25 —             |
| grandiflora Sm. . . . .                         | 6             | — 75             |
| laxa Nutt. . . . .                              | 30            | 4 50             |
| <b>Bulbocodium</b> , Colchicac., Sept.—Nov.     |               |                  |
| robustum Rgl. . . . .                           | —             | 14 —             |
| ruthenicum Bunge . . . . .                      | 30            | 4 50             |
| sobuliferum Fisch. et Mey. . . . .              | —             | 16 —             |
| spec. Corfu . . . . .                           | —             | 15 —             |
| tigrinum hort. . . . .                          | —             | 10 —             |
| vernum L. . . . .                               | 4             | —                |
| <b>Calliprora</b> , Liliac.-Asphod., Sept.—Nov. |               |                  |
| lutea Lindl. . . . .                            | 20            | 3 —              |
| <b>Calochortus</b> , Liliaceae-Tul., Sept.-Dec. |               |                  |
| - albus Bak. . . . .                            | —             | 10 —             |
| - elegans Dougl. . . . .                        | —             | 12 —             |
| - lilacinus Benth. . . . .                      | 50            | 8 —              |
| - luteus Schult. fl. . . . .                    | 40            | 5 —              |
| - longibarbatu h. Horsf. . . . .                | 50            | 8 —              |
| - splendens Dougl. . . . .                      | 50            | 8 —              |
| - venustus Dougl. . . . .                       | 40            | 5 —              |

|                                                 | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Calistegia</b> , Convolvulaceae, Oct.-April. |               |                  |
| dahurica Fisch. . . . .                         | 10            | 1 50             |
| — fl. albo . . . . .                            | 30            | 5 —              |
| — fl. pleno . . . . .                           | 10            | 1 50             |
| pubescens Lindl. . . . .                        | 10            | 1 50             |
| — fl. albo . . . . .                            | 25            | 3 50             |
| <b>Camassia</b> , Liliac.-Asphod., Sept.—Nov.   |               |                  |
| esculenta Lindl. . . . .                        | 6             | 1 —              |
| — alba . . . . .                                | —             | 50 —             |
| — atrocoerulea . . . . .                        | 8             | 1 —              |
| Fraseri Lindl. . . . .                          | 50            | 7 —              |
| <b>Chionodoxa</b> , Liliac.-Asphod., Aug.-Nov.  |               |                  |
| cretica Boiss. . . . .                          | 30            | 5 50             |
| Forbesii Maw. . . . .                           | 90            | 12 —             |
| gigantea. Roiss. . . . .                        | 15            | 2 —              |
| Luciliae. Boiss. . . . .                        | 5             | 1 —              |
| sarniensis Bak. . . . .                         | 5             | 1 —              |
| Tmolasi Boiss. . . . .                          | 18            | 2 50             |
| <b>Chlidanthus</b> , Amaryllideae, Sept.—Nov.   |               |                  |
| fragrans Vent. . . . .                          | 12            | 1 50             |
| <b>Colchicum</b> , Colchicaceae, Aug.—Oct.      |               |                  |
| Agrippinae S. S. (variegatum) . . . . .         | 50            | 7 —              |
| alpinum DC. . . . .                             | 18            | 2 50             |
| arenarium W. et K. . . . .                      | 15            | 2 —              |
| autumnale L. . . . .                            | 4             | —                |
| — albiflorum . . . . .                          | 10            | 1 50             |
| — fl. pleno . . . . .                           | 15            | 2 —              |
| — maximum . . . . .                             | 15            | 2 —              |
| — multiflorum Schur. . . . .                    | 25            | 3 50             |
| — striatum . . . . .                            | 10            | 1 50             |
| Bertolonii Schott. . . . .                      | 50            | 7 —              |
| biflorum Clus. . . . .                          | 18            | 2 50             |
| byzantinum Clus. . . . .                        | 30            | 5 —              |
| croceaefflorum Rgl. . . . .                     | 40            | 6 —              |
| floribundum Ait. . . . .                        | 15            | 2 —              |
| lacteam hort. . . . .                           | 30            | 5 —              |
| laetum Stev. . . . .                            | 20            | 3 —              |
| latifolium Heuff. . . . .                       | 15            | 2 —              |
| luteum Regl. . . . .                            | 70            | 10 —             |
| montanum L. . . . .                             | 18            | 2 50             |
| pannonicum G. et S. . . . .                     | 24            | 3 50             |
| speciosum Stev. . . . .                         | 40            | 6 —              |
| Szovitsianum F. et M. . . . .                   | 40            | 6 —              |
| veratrifolium hort. . . . .                     | 18            | 2 50             |

|                                              | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|----------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Commelina, Commelinaceae, Oct.-April.</b> |               |                  |
| cœlestis W. . . . .                          | 16            | 2 —              |
| scapigera Mart. . . . .                      | 40            | 6 —              |
| stricta Desf. . . . .                        | 16            | 2 —              |
| tuberosa L. . . . .                          | 10            | 1 50             |
| — alba . . . . .                             | 10            | 1 50             |
| — coerulea . . . . .                         | 20            | 3 —              |
| <b>Convallaria, Smilaceae, Oct.—April.</b>   |               |                  |
| ambigua Link. (Polygonatum) . . . . .        | 10            | 1 50             |
| bifolia L. (Smilacina) . . . . .             | 5             | 1 —              |
| giganteum Bnge. (Pol.) . . . . .             | —             | 3 —              |
| japonica Roth. (Flüggea) . . . . .           | 15            | 2 —              |
| latifolium Desf. (Pol.) . . . . .            | 10            | 1 50             |
| macrophyllum Sw. (Pol.) . . . . .            | —             | 5 —              |
| majalis L. . . . .                           | 4             | —                |
| — fl. pleno p. . . . .                       | 15            | 2 —              |
| — fl. roseo . . . . .                        | 6             | 1 —              |
| — variegatifolia . . . . .                   | 20            | 3 —              |
| — striatifolia . . . . .                     | 10            | 1 50             |
| multiflorum All. (Pol.) . . . . .            | 6             | 1 —              |
| oppositifolium Wall. (Pol.) . . . . .        | —             | 55 —             |
| Polygonatum vulgare Desf. . . . .            | 6             | 1 —              |
| — bracteatum . . . . .                       | 10            | 1 50             |
| — fl. pleno . . . . .                        | 25            | 3 50             |
| — fol. variegatis . . . . .                  | —             | 6 —              |
| racemosa Desf. (Smilacina) . . . . .         | —             | 3 —              |
| roseum Ledb. (Pol.) . . . . .                | 60            | 9 —              |
| stellata L. . . . .                          | 10            | 1 50             |
| Thunbergii Steud. . . . .                    | 10            | 1 50             |
| verticillatum All. (Pol.) . . . . .          | 6             | 1 —              |
| <b>Corydalis, Fumariaceae, Oct.—April.</b>   |               |                  |
| bracteata Pers. . . . .                      | 18            | 2 50             |
| bulbosa Pers. (cava) . . . . .               | 5             | 1 —              |
| — angustifolia . . . . .                     | 12            | —                |
| — genuina . . . . .                          | 5             | 1 —              |
| — albiflora . . . . .                        | 10            | 1 50             |
| — pallida . . . . .                          | 8             | 1 30             |
| — purpurea . . . . .                         | 5             | 1 —              |
| decipiens Schott. . . . .                    | 20            | 3 —              |
| fabacea DC. . . . .                          | —             | 16 —             |
| glauca Pursh. . . . .                        | 50            | 7 —              |
| Kolpakowskiana Rgl. . . . .                  | —             | 10 —             |
| Ledebouri Rgl. . . . .                       | —             | 12 —             |
| lutea DC. . . . .                            | 30            | —                |

|                                        | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|----------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Corydalis</b>                       |               |                  |
| nobilis Pers. . . . .                  | 30            | 5 —              |
| ochroleuca Schur. . . . .              | 30            | 5 —              |
| pumila Rchb. . . . .                   | 15            | 2 50             |
| solida Sm. (Halleri) . . . . .         | 3             | —                |
| — fl. albo . . . . .                   | 15            | 3 50             |
| <b>Crociris, Irideae, Aug.—Nov.</b>    |               |                  |
| iridiflora Pall. . . . .               | 20            | 3 —              |
| <b>Crocasmia, Irideae, Oct.—April.</b> |               |                  |
| aurea Blanchon . . . . .               | 4             | —                |
| <b>Crocus, Irideae, Aug.—Nov.</b>      |               |                  |
| alatavicus Rgl. . . . .                | 30            | 5 —              |
| albiflorus Herb. . . . .               | 1             | —                |
| alpinus Kern . . . . .                 | 3             | —                |
| Aucheri Boiss. . . . .                 | 10            | 1 40             |
| aureus Sm. . . . .                     | 20            | 3 —              |
| bannaticus Heuff. . . . .              | 9             | 1 25             |
| biflorus Mill. . . . .                 | 9             | 1 25             |
| chrysanthus hort. . . . .              | 12            | 1 50             |
| grandiflorus Rchb. . . . .             | 5             | —                |
| italicus Rchb. . . . .                 | 9             | 1 25             |
| Imperati Ten. . . . .                  | 5             | —                |
| Korolkowi Rgl. . . . .                 | 40            | 7 —              |
| lacticolor hort. . . . .               | 10            | 1 40             |
| linifolius hort. . . . .               | 3             | —                |
| lineatus Jan. . . . .                  | 10            | 1 40             |
| luteus Lam. . . . .                    | 9             | 1 25             |
| Maesiacus Ker. . . . .                 | 3             | —                |
| neapolitanus Ten. . . . .              | 4             | —                |
| minimus DC. . . . .                    | 10            | 1 40             |
| montenegrinus Kern . . . . .           | 12            | 2 —              |
| nivalis Bory . . . . .                 | 9             | 1 25             |
| parviflorus Rchb. . . . .              | 1             | —                |
| pusillus Ten. . . . .                  | 5             | —                |
| reticulatus M. B. . . . .              | 9             | 1 25             |
| Scharojani Rupr. . . . .               | 50            | 8 —              |
| Sieberi J. . . . .                     | 10            | 1 40             |
| variegatus Hopp. . . . .               | 5             | —                |
| veluchensis Herbig. . . . .            | 12            | 1 50             |
| vernus L. . . . .                      | 1             | —                |
| — Janii Rchb. . . . .                  | 10            | 1 40             |
| — leucastigma hort. . . . .            | 12            | 2 —              |
| — Tenori Rchb. . . . .                 | 9             | 1 20             |
| versicolor Gawl. . . . .               | 3             | —                |

|                                              | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|----------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Crocus</b>                                |               |                  |
| aestivus L. . . . .                          | 10            | 1 50             |
| autumnalis Lam. . . . .                      | 10            | 1 50             |
| cancelatus Herbert . . . . .                 | —             | —                |
| carpetanus Boiss. . . . .                    | —             | —                |
| cilicicus Kotsch. . . . .                    | —             | —                |
| Clusii Gay. . . . .                          | 20            | 3 —              |
| dalmaticus Kern. . . . .                     | 10            | 1 50             |
| etruscus Parl. . . . .                       | —             | —                |
| Fleischeri Boiss. . . . .                    | 10            | 1 50             |
| hyemalis Boiss. . . . .                      | 20            | 3 —              |
| longiflorus Pall. . . . .                    | 18            | 3 —              |
| medius Balb. . . . .                         | —             | —                |
| nudiflorus Sm. . . . .                       | 20            | 3 —              |
| ochroleucus hort. . . . .                    | 9             | 1 40             |
| Pallasii M. B. . . . .                       | 9             | 1 50             |
| sativus L. . . . .                           | 1             | —                |
| serotinus Bertol. . . . .                    | —             | —                |
| speciosum M. B. . . . .                      | 5             | —                |
| Thommasii Ten. . . . .                       | 10            | 1 50             |
| zonatus Gay. . . . .                         | —             | —                |
| <b>Cyclamen, Primulaceae, Juni—August.</b>   |               |                  |
| — Coum Mill. . . . .                         | 25            | 3 50             |
| — europaeum L. . . . .                       | 3             | —                |
| — tenuifolium L. . . . .                     | 7             | 1 25             |
| — graecum L. . . . .                         | 20            | 3 —              |
| — hederæfolium Ait. . . . .                  | 20            | 3 —              |
| — fl. albo hort. . . . .                     | 50            | 7 —              |
| — neapolitanum L. . . . .                    | 35            | 5 —              |
| — repandum Sibth. Sm. . . . .                | 9             | 1 50             |
| <b>Cypella, Irideae, October—April.</b>      |               |                  |
| Herberti Rgl. . . . .                        | 20            | 3 —              |
| <b>Delphinium, Ranunculaceae, Oct.—März.</b> |               |                  |
| fissum W. et K. . . . .                      | 18            | 2 50             |
| nudicaule Rgl. . . . .                       | 40            | 6 —              |
| <b>Dentaria, Cruciferae, Sept.—Nov.</b>      |               |                  |
| bulbifera L. . . . .                         | 5             | —                |
| digitata Lam. . . . .                        | 9             | 1 50             |
| eneaphyllos L. . . . .                       | 9             | 1 40             |
| glandulosa W. et Kit. . . . .                | 18            | 3 —              |
| intermedia Leyb. . . . .                     | 16            | 2 —              |
| pinnata Lam. . . . .                         | 18            | 3 —              |
| polyphylla W. et K. . . . .                  | 20            | 3 —              |
| trifolia W. et Kit. . . . .                  | 18            | 2 50             |

|                                                | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Diclytra</b> (Dic.), Fumariac., Oct.—April. |               |                  |
| cucularia L. . . . .                           | 18            | 3 —              |
| eximia DC. . . . .                             | 9             | 1 50             |
| formosa DC. . . . .                            | 12            | 2 —              |
| spectabilis DC. . . . .                        | 18            | 2 50             |
| — fl. albo . . . . .                           | 90            | 15 —             |
| <b>Dodecatheon</b> , Primulaceae, Sept.—April. |               |                  |
| integrifolium Michx. . . . .                   | 30            | 5 —              |
| Jeffrayi hort. angl. . . . .                   | 30            | 5 —              |
| Meadia L. . . . .                              | 18            | 3 —              |
| — album . . . . .                              | 30            | 5 —              |
| — carneum . . . . .                            | 90            | 15 —             |
| — elegans . . . . .                            | 75            | 12 —             |
| — giganteum . . . . .                          | —             | 15 —             |
| — lilacinum . . . . .                          | 90            | 15 —             |
| — purpureum . . . . .                          | —             | —                |
| <b>Epimedium</b> , Berberideae, Oct.—März.     |               |                  |
| alpinum L. . . . .                             | 9             | 1 50             |
| micranthum Dne. . . . .                        | 18            | 2 50             |
| nigrum hort. . . . .                           | 20            | 3 —              |
| ochroleucum Dne. . . . .                       | 30            | 5 —              |
| roseum hort. . . . .                           | 20            | 3 —              |
| violaceum Dne. . . . .                         | 25            | 5 —              |
| <b>Eranthis</b> , Ranunculaceae, Aug.—Nov.     |               |                  |
| hyemalis Ser. . . . .                          | 2             | —                |
| <b>Eremostachys</b> , Labiatae, Oct.—April.    |               |                  |
| laciniata Bge. . . . .                         | —             | 6 —              |
| <b>Eremurus</b> , Liliac.-Asphod, Sept.—Nov.   |               |                  |
| Kaufmani Rgl. . . . .                          | —             | 10 —             |
| altaicus Stev. . . . .                         | —             | 40 —             |
| Bungei Baker . . . . .                         | —             | 80 —             |
| himalaicus Bnge. . . . .                       | —             | 90 —             |
| Olgae Rgl. . . . .                             | —             | 80 —             |
| robustus Rgl. . . . .                          | —             | —                |
| spec. . . . .                                  | —             | —                |
| spectabilis M. Bieb. . . . .                   | —             | 8 —              |
| turkestanicus Rgl. . . . .                     | —             | 20 —             |
| <b>Eryngium</b> , Umbelliferae, Oct.—April.    |               |                  |
| alpinum L. . . . .                             | 18            | 3 —              |
| amethystinum L. . . . .                        | 15            | 2 50             |
| — fl. albo . . . . .                           | —             | 10 —             |
| carniolicum Döll. . . . .                      | 18            | 2 50             |
| cyaneum hort. . . . .                          | 20            | 3 —              |
| planum DC. . . . .                             | 18            | 2 50             |

|                                                   | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Erythronium, Liliac.-Tulipaceae, Aug.</b>      |               |                  |
| albidum Nutt. . . . .                             | 40            | 5 50             |
| americanum Sm. . . . .                            | 9             | 1 35             |
| Dens canis L. . . . .                             | 3             | —                |
| — album . . . . .                                 | 5             | — 80             |
| — purpureum . . . . .                             | 5             | —                |
| — roseum . . . . .                                | 5             | —                |
| — violaceum . . . . .                             | 5             | — 80             |
| grandiflorum Pursh. . . . .                       | 5             | —                |
| — album . . . . .                                 | 5             | — 80             |
| — purpureum . . . . .                             | 9             | 1 35             |
| — rubrum . . . . .                                | 5             | —                |
| — — majus . . . . .                               | 30            | 5 —              |
| — — — album . . . . .                             | 30            | 5 —              |
| — — — purpureum . . . . .                         | 30            | 5 —              |
| — — — roseum . . . . .                            | 30            | 5 —              |
| giganteum Lindl. . . . .                          | 90            | 15 —             |
| Nuttalli Schltz. . . . .                          | 50            | 7 —              |
| sibiricum Rgl. . . . .                            | 9             | 1 25             |
| Smithianum . . . . .                              | 50            | 7 —              |
| <b>Ferraria, Irideae, Nov.-Mai.</b>               |               |                  |
| canariensis hort. . . . .                         | 20            | 3 —              |
| coelestina hort. . . . .                          | 20            | 3 —              |
| coronaria L. . . . .                              | 18            | 2 50             |
| grandiflora Salish. . . . .                       | 9             | 1 25             |
| undulata L. . . . .                               | 18            | 2 50             |
| speciosa hort. . . . .                            | 10            | 1 50             |
| <b>Freesea, Irideae, Oct.—April.</b>              |               |                  |
| hybrida Klatt. . . . .                            | 5             | —                |
| Leichlini Klatt. . . . .                          | 9             | 1 25             |
| refracta Rgl. . . . .                             | 5             | —                |
| <b>Fritillaria, Liliaceae-Tulipac., Juli-Oct.</b> |               |                  |
| aquitana Clus. . . . .                            | 9             | 1 25             |
| Bucharica Rgl. . . . .                            | —             | 2 —              |
| californica hort. Horsf. . . . .                  | 90            | 15 —             |
| imperialis L. . . . .                             | 15            | 2 —              |
| inodora Rgl. . . . .                              | —             | 25 —             |
| involucrata All. . . . .                          | 30            | 5 —              |
| lanceolata All. . . . .                           | 50            | 7 —              |
| lutea Rgl. . . . .                                | 30            | 5 —              |
| macrophylla Don. . . . .                          | 45            | 6 50             |
| Meleagris L. . . . .                              | 9             | 1 25             |
| minor Ledb. . . . .                               | 20            | 3 —              |
| montana Hopp. . . . .                             | 20            | 3 —              |

|                                               | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Fritillaria</b>                            |               |                  |
| pallidiflora Schrenck . . . . .               | —             | 15 —             |
| persica hort Krel. . . . .                    | —             | —                |
| pyrenaica L. . . . .                          | 20            | 3 —              |
| racemosa Ker. . . . .                         | 20            | 3 —              |
| ruthenica Wikstr. . . . .                     | —             | 12 —             |
| Sewerzowi Rgl. . . . .                        | —             | 20 —             |
| — discolor . . . . .                          | —             | 25 —             |
| sylvestris Rgl. . . . .                       | —             | 20 —             |
| tenella M. B. . . . .                         | 20            | 3 —              |
| tristis L. . . . .                            | —             | 15 —             |
| <b>Funkia</b> , Liliac.-Hemerocal., Oct.-Apr. |               |                  |
| alba L. . . . .                               | —             | 5 —              |
| bracteata Spr. . . . .                        | —             | 6 —              |
| cucullata hort. . . . .                       | 12            | 2 50             |
| Fortunei hort. . . . .                        | —             | 6 —              |
| ovata Spr. . . . .                            | 18            | 3 —              |
| — albo-marginata . . . . .                    | 30            | 4 50             |
| Sieboldina Hook. . . . .                      | —             | 6 —              |
| — grandiflora Hook. . . . .                   | —             | 8 —              |
| undulata L. . . . .                           | 25            | 4 —              |
| univittata hort. . . . .                      | 20            | 3 —              |
| <b>Galanthus</b> , Amaryllideae, Aug.—Nov.    |               |                  |
| Elwesi, Bak. . . . .                          | 5             | 1 —              |
| Imperati, Ten. . . . .                        | 5             | 1 —              |
| montanus Schur. . . . .                       | 6             | 1 —              |
| nivalis, L. . . . .                           | 1             | —                |
| — fl. pleno . . . . .                         | 3             | —                |
| parviflorus Gusmus . . . . .                  | 5             | 1 —              |
| plicatus, M. B. . . . .                       | 18            | 2 50             |
| praecox Maw. . . . .                          | 30            | 4 50             |
| Redoutei, Rgl. . . . .                        | 18            | 2 50             |
| — reflexus fl. pleno hort. . . . .            | 50            | 7 —              |
| <b>Geranium</b> , Geraniaceae, Aug.—Nov.      |               |                  |
| macrorrhizum L. . . . .                       | 5             | 1 —              |
| tuberosum L. . . . .                          | 3             | —                |
| <b>Gladiolus</b> , Irideae, Sept.—Nov.        |               |                  |
| blandus Spr. . . . .                          | 3             | —                |
| Brenchleyensis hort. . . . .                  | 3             | —                |
| byzantinus Mill. . . . .                      | 3             | —                |
| Colvilli Swert . . . . .                      | 3             | —                |
| communis L. . . . .                           | 3             | —                |
| cruentus Ait. . . . .                         | 7             | 1 —              |
| gandavensis hort. . . . .                     | 6             | 1 50             |

|                                                  | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Gladiolus.</b>                                |               |                  |
| illiricus Koch. . . . .                          | 6             | 1 —              |
| imbricatus L. . . . .                            | 9             | 1 25             |
| nanus Andr. . . . .                              | 3             | —                |
| palustris Koch. . . . .                          | 3             | —                |
| psittacinus L. . . . .                           | 4             | —                |
| ramosus Murr. . . . .                            | 7             | 1 15             |
| sagittalis L. . . . .                            | 15            | 2 —              |
| segetum Gawl. . . . .                            | 5             | 1 —              |
| tenuis M. B. . . . .                             | 20            | 3 —              |
| <b>Hacquetia</b> (Dond.), Umbelliferae, Herbst.  |               |                  |
| Epipactis DC. . . . .                            | 9             | 1 25             |
| <b>Helicophyllum</b> , Aroideae.                 |               |                  |
| Alberti Rgl. . . . .                             | —             | 20 —             |
| Lehmannianum Bnge. . . . .                       | —             | 15 —             |
| <b>Helleborus</b> , Ranunculaceae, Herbst.       |               |                  |
| altifolius Host. . . . .                         | 20            | 3 —              |
| angustifolius Host. . . . .                      | 30            | 4 50             |
| atropurpureus Schltz. . . . .                    | 25            | 4 —              |
| atrorubens W. K. . . . .                         | 18            | 2 50             |
| Bocconeï Ten. . . . .                            | 15            | 2 —              |
| cupreus Host. . . . .                            | 24            | 4 —              |
| dumetorum Kit. . . . .                           | 16            | 2 —              |
| foetidus L. . . . .                              | 9             | 1 25             |
| graveolens Host. . . . .                         | 18            | 2 50             |
| hybridus hort. . . . .                           | 50            | 7 —              |
| intermedius Host. . . . .                        | 30            | 4 50             |
| * laciniosus hort. . . . .                       | 40            | 6 —              |
| laxus Host. . . . .                              | 15            | 2 —              |
| macranthus Schott. . . . .                       | 20            | 3 —              |
| — maximus hort. . . . .                          | 40            | 6 —              |
| — variegatifolius hort. . . . .                  | —             | 80 —             |
| * niger L. . . . .                               | 10            | 1 50             |
| — maximus hort. . . . .                          | 12            | 1 80             |
| odorus Sadl. . . . .                             | 15            | 2 —              |
| pallidus Host. . . . .                           | 12            | 1 80             |
| purpurascens W. et K. . . . .                    | 25            | 4 —              |
| viridis L. . . . .                               | 10            | 1 50             |
| <b>Hemerocallis</b> , Liliac.-Asphod., Oct.-Apr. |               |                  |
| flava L. . . . .                                 | 20            | 3 —              |
| fulva L. . . . .                                 | 20            | 3 —              |
| graminea Andr. . . . .                           | 24            | 4 —              |
| graminifolia Schlechtd. . . . .                  | 30            | 4 50             |
| Middendorffiana Traut . . . . .                  | 50            | 7 —              |

|                                                  | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Hepatica</b> , Ranunculaceae, Sept.—Apr.      |               |                  |
| angulosa transsylvanica Fuss. . . . .            | 12            | 1 80             |
| — pallida Gusmus . . . . .                       | 50            | 8 —              |
| triloba L. . . . .                               | 4             | —                |
| — fl. albo stam. albis . . . . .                 | 5             | 1 —              |
| — fl. albo stam. rubris . . . . .                | 4             | —                |
| — coerulea . . . . .                             | 4             | —                |
| — fl. pleno . . . . .                            | 80            | 10 —             |
| — rubra . . . . .                                | 4             | —                |
| — fl. pleno . . . . .                            | 20            | 3 —              |
| <b>Hoteia</b> (Spiraea), Saxifrageae, Sept.-Apr. |               |                  |
| japonica L. fl. . . . .                          | 9             | 1 25             |
| <b>Hyacinthus</b> , Liliac.-Asphod., Sept.-Nov.  |               |                  |
| amethystinus L. . . . .                          | 9             | 1 25             |
| bifolius Bautel. . . . .                         | 75            | 10 —             |
| candicans Bak. . . . .                           | 5             | 1 —              |
| dubius Guss. . . . .                             | 32            | 4 50             |
| leucophaeus Stev. . . . .                        | 18            | 3 —              |
| orientalis L. . . . .                            | —             | —                |
| romanus L. . . . .                               | 20            | 3 —              |
| <b>Iris</b> , Irideae. Sept.—April, Rhizome.     |               |                  |
| amoena Rgl. . . . .                              | 75            | 10 —             |
| arenaria W. et Kit. . . . .                      | 18            | 3 —              |
| balcana Ja. . . . .                              | 75            | 10 —             |
| Benacensis Kern. . . . .                         | —             | 18 —             |
| biflora L. . . . .                               | 9             | 1 25             |
| binnata Schur. . . . .                           | 45            | 7 —              |
| bohemica Schmidt. . . . .                        | 20            | 3 —              |
| bosnica Beck . . . . .                           | —             | 15 —             |
| caespitosa L. . . . .                            | 28            | 3 50             |
| coerulea Spach. . . . .                          | 50            | 8 —              |
| cuprea Pursh. . . . .                            | 90            | 12 —             |
| Fieberi Seidl. . . . .                           | 60            | 9 —              |
| flavescens Red. . . . .                          | 35            | 5 —              |
| flavissima Janka. . . . .                        | 60            | 9 —              |
| furcata M. B. . . . .                            | 28            | 3 50             |
| gigantea Ait. . . . .                            | 50            | 7 —              |
| Güldenstaedtiana Lepech. . . . .                 | 9             | 1 25             |
| heterophylla hort. par. . . . .                  | —             | 15 —             |
| humilis M. B. . . . .                            | 75            | 10 —             |
| hungarica W. et K. . . . .                       | 80            | 10 —             |
| lutescens Lam. . . . .                           | 20            | 3 —              |
| lurida Soland. . . . .                           | 30            | 3 50             |
| Matthioli Tausch. . . . .                        | 75            | 10 —             |

|                                            | 100 St. | 12 St. |
|--------------------------------------------|---------|--------|
|                                            | M.      | M. dl. |
| <b>Iris.</b>                               |         |        |
| mongolica Fisch. . . . .                   | 25      | 3 —    |
| nudicaulis Lam. . . . .                    | 25      | 3 —    |
| orientalis Thunb. . . . .                  | —       | 12 —   |
| Pallasi Fisch. . . . .                     | 60      | 9 —    |
| pallida Lam. . . . .                       | 20      | 3 —    |
| praevox hort. . . . .                      | 75      | 10 —   |
| Reichenbachiana Heuff. . . . .             | 90      | 12 —   |
| Rosenbachiana Rgl. . . . .                 | —       | 18 —   |
| ruthenica Schr. . . . .                    | 20      | 3 —    |
| serbica Pankn. . . . .                     | —       | 20 —   |
| Sogdiana Andr. . . . .                     | 75      | 10 —   |
| songorica hort. vind. . . . .              | —       | 15 —   |
| sordida Willd. . . . .                     | 20      | 3 —    |
| spuria L. . . . .                          | 20      | 3 —    |
| sub barbata Schur. . . . .                 | 35      | 6 —    |
| Swertii Lam. . . . .                       | —       | 20 —   |
| transsylvanica Schur. . . . .              | 60      | 9 —    |
| tridentata Pursh. . . . .                  | —       | 9 —    |
| variegata L. . . . .                       | 20      | 3 —    |
| Cengialti Ambr. . . . .                    | 75      | 10 —   |
| germanica L. . . . .                       | 5       | 1 —    |
| Kaempferi Sieb. . . . .                    | 18      | 3 —    |
| pumila Jacq. . . . .                       | 3       | —      |
| <b>Iris tuberosa.</b>                      |         |        |
| alata Lam. . . . .                         | —       | 8 —    |
| anglica hort. . . . .                      | 1       | —      |
| caucasica Rgl. . . . .                     | 80      | 10 —   |
| hispanica hort. . . . .                    | 2       | —      |
| iberica Hoffm. . . . .                     | 20      | 3 —    |
| moraeoides Ker. . . . .                    | 5       | 1 —    |
| pavonina L. fil. . . . .                   | 9       | 1 25   |
| persica L. . . . .                         | 5       | 1 —    |
| reticulata M. B. . . . .                   | 30      | 3 50   |
| susiana L. . . . .                         | 30      | 3 50   |
| tuberosa L. . . . .                        | 5       | 1 —    |
| xiphioides Ehrh. . . . .                   | 9       | 1 25   |
| <b>Isopyrum, Ranunculaceae, Oct.—Nov.</b>  |         |        |
| thalictroides L. . . . .                   | 5       | 1 —    |
| <b>Ixia, Irideae, Aug.—Nov.</b>            |         |        |
| var diversae . . . . .                     | 3       | —      |
| <b>Ixiolirion, Amaryllideae, Aug.—Oct.</b> |         |        |
| Pallassi F. et Mey. . . . .                | —       | 5 —    |
| tataricum Herb. . . . .                    | —       | 5 —    |

|                                                   | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Korolkowia</b> (Fritillaria), Liliac.-Tulipac. |               |                  |
| Sewerzowi Rgl. . . . .                            | —             | 30 —             |
| <b>Leontice</b> , Berberideae, Aug.—Nov.          |               |                  |
| Alberti Rgl. . . . .                              | —             | 18 —             |
| altaica Rgl. . . . .                              | —             | 20 —             |
| Ewersmanni Rgl. . . . .                           | —             | 30 —             |
| Leontopetalum L. . . . .                          | 80            | —                |
| Rauwolfiana Rgl. . . . .                          | —             | —                |
| thalictroides L. . . . .                          | —             | 12 —             |
| vesicaria Rgl. . . . .                            | —             | —                |
| <b>Leucojum</b> , Amaryllideae, Aug.—Oct.         |               |                  |
| aestivum L. . . . .                               | 1             | —                |
| autumnale L. . . . .                              | 18            | 3 —              |
| carpaticum Schr. . . . .                          | 5             | —                |
| pulchellum Gawl. . . . .                          | 15            | 2 50             |
| vernum L. . . . .                                 | 1             | —                |
| <b>Libertia</b> , Irideae, in Töpfen.             |               |                  |
| azurea hort. . . . .                              | 50            | 7 —              |
| formosa Grah. . . . .                             | 35            | 6 —              |
| grandiflora R. Br. . . . .                        | 50            | 7 —              |
| pulchella Sprenger . . . . .                      | —             | 6 —              |
| tricolor Hort. . . . .                            | 50            | 7 —              |
| <b>Lilium</b> , Liliacae-Tulipac., Sept.-Apr.     |               |                  |
| * albanicum Grisbach . . . . .                    | 100           | 14 —             |
| auratum Thbg. . . . . 100 bis                     | 200           | 20 —             |
| * bulbiferum L. . . . .                           | 15            | 2 50             |
| canadense L. . . . .                              | 40            | 6 50             |
| candidum L. . . . .                               | 10            | 1 50             |
| — fl. pleno . . . . .                             | 30            | 3 50             |
| — maculatum . . . . .                             | 50            | 7 —              |
| — speciosum . . . . .                             | 60            | 9 —              |
| * carniolicum Bernh. . . . .                      | 10            | 1 50             |
| * — luteum Gusmus . . . . .                       | 100           | 15 —             |
| * Cataniae Vis. . . . .                           | 100           | 15 —             |
| chalcedonicum L. . . . .                          | 60            | 9 —              |
| croceum Chaix . . . . .                           | 16            | 2 50             |
| * dalmaticum Maly . . . . .                       | 30            | 3 50             |
| * — nigrum Gusmus . . . . .                       | 75            | —                |
| dahuricum Ker. . . . .                            | 30            | 3 50             |
| Harrisii hort. . . . . 30 bis                     | 80            | 12 —             |
| Jankaeana Kern. . . . .                           | 150           | 24 —             |
| longiflorum Thunbg. . . . .                       | 18            | 3 —              |
| Martagon L. . . . .                               | 10            | 1 50             |
| — nigrum Gusmus . . . . .                         | 200           | 25 —             |

|                                               | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Martagon.</b>                              |               |                  |
| — album.                                      | —             | —                |
| monadelphum M. B.                             | —             | —                |
| pardalinum Kellog.                            | 30            | 4 50             |
| Philadelphicum L.                             | 25            | 3 50             |
| pomporium L.                                  | 20            | 3 —              |
| speciosum Thbg. var. diversae                 | 35            | 6 —              |
| superbum L.                                   | 20 150        | 6 —              |
| Szovitzianum Fisch. et Lal.                   | 150 20        | 15 —             |
| tenuifolium Fisch.                            | 40            | 6 —              |
| Thunbergianum R. et S.                        | 16            | 2 50             |
| tigrinum Gawl.                                | 10            | 1 20             |
| — splendens                                   | 20            | 3 —              |
| umbellatum DC.                                | 12            | 1 80             |
| <b>Lloydia</b> , Tulipaceae, Oct.—Nov.        |               |                  |
| serotina Rchb.                                | 10            | 1 25             |
| <b>Lycoris</b> (Amaryllis), Amaryllideae.     |               |                  |
| aurea Herb.                                   | —             | 85 —             |
| <b>Merendera</b> , Colchicaceae, Sept.—Nov.   |               |                  |
| ruthenica Koch.                               | —             | 18 —             |
| sobolifera F. et M.                           | 8             | 1 20             |
| <b>Mertensia</b> , Boragineae, Sept.—April.   |               |                  |
| virginica Don.                                | 50            | 6 50             |
| <b>Michauxia</b> , Campanulaceae, Oct.—Apr.   |               |                  |
| campanulata Juss.                             | 90            | 12 —             |
| <b>Montbretia</b> , Irideae, Sept.—Nov.       |               |                  |
| crocasmiaeflora Lemoin                        | 8             | 1 20             |
| Pottsii Bak.                                  | 3             | —                |
| <b>Muscari</b> , Liliac.-Asphodel., Aug.—Nov. |               |                  |
| amphibolis Schott.                            | —             | 12 —             |
| Arenarium Steud.                              | —             | —                |
| armeniicum R. K.                              | 35            | 6 —              |
| atlanticum Boiss.                             | 35            | 6 —              |
| azureum                                       | —             | —                |
| Botryoides Mill.                              | 3             | —                |
| — album                                       | 5             | — 80             |
| — carneum                                     | 20            | 3 —              |
| — coeruleum                                   | 5             | — 80             |
| — pallidum                                    | 10            | 1 25             |
| commutatatum Schott.                          | 6             | 1 —              |
| comosum Mill.                                 | 8             | 1 20             |
| — atropurpureum                               | 8             | 1 20             |
| dilatatum L.                                  | —             | —                |
| Heldreichi Boiss.                             | 20            | 3 —              |

**Muscari.**

|                                | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|--------------------------------|---------------|------------------|
| Maweanum R. K. . . . .         | —             | —                |
| monstrosum hort. . . . .       | 6             | 1 —              |
| moschatum Desf. . . . .        | 20            | 3 —              |
| neglectum Guss. . . . .        | 8             | 1 —              |
| pallens Bess. . . . .          | 40            | 6 —              |
| paradoxum Kth. . . . .         | —             | —                |
| plumosum hort. . . . .         | 5             | 1 —              |
| pulchellum Heldr. . . . .      | 20            | 3 —              |
| racemosum Mill. . . . .        | 3             | —                |
| Szovitzianum . . . . .         | 30            | 4 —              |
| tenuiflorum Tausch. . . . .    | —             | 12 —             |
| transsylvanicum Schur. . . . . | 30            | 3 —              |

**Myogalum, Liliac.-Asphod., Herbst.**

|                         |    |     |
|-------------------------|----|-----|
| Boucheanum Rgl. . . . . | 20 | 3 — |
|-------------------------|----|-----|

**Narcissus, Aug.-Nov.**

|                              |    |      |
|------------------------------|----|------|
| angustifolius Curt. . . . .  | 5  | 1 —  |
| aureus Lois. . . . .         | 50 | 8 —  |
| biflorus Curt. . . . .       | 20 | 3 —  |
| Bulbocodium L. . . . .       | 6  | 1 —  |
| chrysanthus DC. . . . .      | 40 | 6 —  |
| compressus Haw. . . . .      | —  | 10 — |
| cernuus hort. vind. . . . .  | 30 | 4 —  |
| dubius Goua. . . . .         | 5  | 1 —  |
| incomparabilis Curt. . . . . | 10 | 1 40 |
| intermedius L. . . . .       | 3  | —    |
| italicus h. vind. . . . .    | 10 | 1 40 |
| Jonquilla L. . . . .         | 5  | 1 —  |
| juncifolius Req. . . . .     | 15 | 2 50 |
| laetus Salisb. . . . .       | 30 | 4 —  |
| majalis Curt. . . . .        | 5  | 1 —  |
| major Curt. . . . .          | 12 | 2 —  |
| neglectus Schur. . . . .     | 20 | 3 —  |
| ochroleucus Lois. . . . .    | 30 | 4 —  |
| odorus L. . . . .            | 6  | 1 —  |
| orientalis L. Gaw. . . . .   | 3  | —    |
| pallida Lam. . . . .         | 15 | 2 50 |
| patulus Gusmus . . . . .     | 30 | 4 —  |
| papyraceus Salisb. . . . .   | 6  | 1 —  |
| polyanthus L. . . . .        | 50 | 8 —  |
| praecox hort. . . . .        | 10 | 1 25 |
| Pseudo-Narcissus L. . . . .  | 6  | 1 —  |
| reflexus Lois . . . . .      | 30 | 4 —  |
| stellatus DC. . . . .        | 20 | 3 —  |

|                                                  | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Ophiopogon</b> , Seitamineae, Oct.—April.     |               |                  |
| jaburum Lodd. . . . .                            | 30            | 4 —              |
| var. aureum . . . . .                            | 90            | 12 —             |
| japonicum Ker. . . . .                           | 30            | 4 —              |
| coeruleum hort. . . . .                          | 30            | 4 —              |
| var. argenteum . . . . .                         | 18            | 2 50             |
| spicatum Ives . . . . .                          | £5            | 5 —              |
| <b>Ornithogalum</b> , Liliac.-Asphod., Aug.-Oct. |               |                  |
| algeriense hort. Krel. . . . .                   | 18            | 2 50             |
| altissimum L. . . . .                            | 35            | 5 —              |
| arcuatum Stev. . . . .                           | —             | 15 —             |
| arabicum L. . . . .                              | 10            | 1 50             |
| aureum Curt. . . . .                             | 90            | 12 —             |
| bracteatum hort. . . . .                         | —             | 12 —             |
| collinum Gust. . . . .                           | 20            | 3 —              |
| comosum L. . . . .                               | 15            | 2 25             |
| exscapum Ten. . . . .                            | 20            | 3 —              |
| fimbriatum L. . . . .                            | 20            | 3 —              |
| junceum Rgl. . . . .                             | 20            | 3 —              |
| laetum Jacq. . . . .                             | 90            | 12 —             |
| luteum W. . . . .                                | 30            | 4 —              |
| narbonense L. . . . .                            | 15            | 2 —              |
| montanum Cyr. . . . .                            | —             | 15 —             |
| pallens Vis. . . . .                             | 18            | 2 50             |
| * Pater Familias . . . . .                       | 10            | 1 50             |
| pyramidale L. . . . .                            | 40            | 6 —              |
| pyrenaicum L. . . . .                            | 20            | 3 —              |
| refractum W. et K. . . . .                       | —             | 12 —             |
| sulphureum Bertolonii . . . . .                  | 20            | 3 —              |
| tenuifolium Ledb. . . . .                        | —             | 15 —             |
| striatum M. B. . . . .                           | 10            | 1 50             |
| umbellatum L. . . . .                            | 5             | 1 —              |
| <b>Narthecium</b> , Liliac.-Asphod., Sept.       |               |                  |
| ossifragum Huds. . . . .                         | 30            | 4 —              |
| <b>Orobis</b> , Papilionaceae, Sept.—April.      |               |                  |
| tuberosus L. . . . .                             | 10            | 1 50             |
| <b>Ostrowskia</b> , Campanulac., Sept.-April.    |               |                  |
| magnifica Rgl. . . . .                           | —             | 15 —             |
| <b>Oxalis</b> , Oxalideae, Aug.—Oct.             |               |                  |
| Deppei hort. . . . .                             | 3             | —                |
| lutea hort. . . . .                              | 3             | —                |
| rosea Jacq. . . . .                              | 5             | 1 —              |
| triliifolia Nutt. . . . .                        | 20            | 3 —              |
| valdiviensis Barn. . . . .                       | 20            | 3 —              |

|                                               | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Paeonia, Ranunculaceae, Aug.—Sept.</b>     |               |                  |
| anomala W. . . . .                            | 75            | 10 —             |
| banatica Rochel. . . . .                      | 50            | 7 —              |
| * corallima Retz. . . . .                     | 30            | 4 50             |
| dahurica Andr. . . . .                        | 50            | 7 —              |
| festiva Tausch. . . . .                       | 80            | 10 —             |
| hirsuta Mill. . . . .                         | 75            | 10 —             |
| humilis Lk. . . . .                           | 70            | 10 —             |
| officinalis Retz. . . . .                     | 18            | 3 —              |
| peregrina Rchb. . . . .                       | 50            | 7 —              |
| porrigens Rchb. . . . .                       | 75            | 10 —             |
| promiscua Lob. . . . .                        | 75            | 10 —             |
| * pubens Sims. . . . .                        | 18            | 3 —              |
| — latifolia . . . . .                         | 30            | 4 50             |
| rosea Host. . . . .                           | 50            | 7 —              |
| tenuifolia L. . . . .                         | 20            | 3 —              |
| — latifolia . . . . .                         | 50            | 7 —              |
| — alba . . . . .                              | 90            | 12 —             |
| — rosea . . . . .                             | 50            | 7 —              |
| — fl. pleno . . . . .                         | —             | 20 —             |
| <b>Pancratium, Amaryllideae, Herbst.</b>      |               |                  |
| illiricum L. . . . .                          | 18            | 3 —              |
| maritimum Lam. . . . .                        | 25            | 4 —              |
| parviflorum L. . . . .                        | 50            | 7 —              |
| <b>Paris, Smilaceae, Oct.—April.</b>          |               |                  |
| quadrifolia L. . . . .                        | 3             | —                |
| <b>Pentlandia, Amaryllideae, Oct.—Mai.</b>    |               |                  |
| miniata Lindl. . . . .                        | 90            | 12 —             |
| <b>Phaedranassa, Amaryllideae, Oct.—Apr.</b>  |               |                  |
| chloracra Herb. . . . .                       | 18            | 3 —              |
| Fuchsioides H. Lind. . . . .                  | —             | 18 —             |
| gloriosa H. S. . . . .                        | 20            | 3 —              |
| obtusata Herb. . . . .                        | 30            | 4 50             |
| <b>Phalangium (Anth.), Lil.-Asphod.</b>       |               |                  |
| algericum hort. . . . .                       | 18            | 3 —              |
| liniare Mak. . . . .                          | 50            | 7 —              |
| <b>Phlomis, Labiatae, Oct.—April.</b>         |               |                  |
| tuberosa L. . . . .                           | 20            | 3 —              |
| <b>Physalis, Solaneae, Sept.—März.</b>        |               |                  |
| Alkekengi L. . . . .                          | 3             | —                |
| + verrucosa . . . . .                         | 10            | 1 50             |
| <b>Podophyllum, Papaveraceae, Oct.—April.</b> |               |                  |
| Emodi Wall. . . . .                           | —             | 18 —             |
| peltum Ledb. . . . .                          | 50            | 7 —              |

|                                                 | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Polyanthes</b> , Amaryllideae, Nov.-Mai.     |               |                  |
| tuberosus L. . . . .                            | —             | —                |
| — fl. pleno . . . . .                           | —             | —                |
| — africanus . . . . .                           | —             | —                |
| — americanus . . . . .                          | —             | —                |
| — — The Pearl. . . . .                          | —             | —                |
| <b>Puschkinia</b> , Liliac.-Asphod., Aug.-Sept. |               |                  |
| libanotica Boiss. . . . .                       | 12            | 1 50             |
| scilloides Adams . . . . .                      | 90            | 12 —             |
| <b>Ranunculus</b> , Ranunculac., Sept.—April.   |               |                  |
| aconitifolius L. fl. pleno . . . . .            | —             | 6 —              |
| africanus hort. . . . .                         | 3             | —                |
| asiaticus L. . . . .                            | 3             | —                |
| aureus Schl. flore pleno . . . . .              | 20            | 3 —              |
| Biria Gusmus . . . . .                          | 10            | 1 25             |
| carpaticus Herb. . . . .                        | 15            | 1 50             |
| chrysanthemiflorus h. . . . .                   | 5             | —                |
| concinatus W. et K. . . . .                     | 28            | 4 50             |
| croaticus Schott. . . . .                       | 20            | 3 —              |
| gracilis Sch. . . . .                           | 15            | 1 50             |
| hybridus Br. . . . .                            | 10            | 1 25             |
| millefoliatus Vabl. . . . .                     | 15            | 1 50             |
| scutatus W. K. . . . .                          | 20            | 3 —              |
| reptans L. fl. pleno . . . . .                  | 15            | 1 50             |
| serbicus Panc. . . . .                          | 20            | 3 —              |
| speciosus hort. . . . .                         | —             | 4 —              |
| Thora L. . . . .                                | 10            | 1 25             |
| Villarsi DC. . . . .                            | 15            | 1 50             |
| <b>Rhodiola</b> , Crassulaceae, Aug.—Nov.       |               |                  |
| rosea foemina L. . . . .                        | 1             | —                |
| — mas. . . . .                                  | 10            | 1 25             |
| Scopolini Kern . . . . .                        | 25            | 3 50             |
| <b>Salvia</b> , Labiatae, Oct.—April.           |               |                  |
| patens Benth. . . . .                           | 20            | 3 —              |
| <b>Sanguinaria</b> , Papaveraceae, Sept.-Nov.   |               |                  |
| canadensis L. . . . .                           | 15            | 1 50             |
| <b>Saxifraga</b> , Saxifrageae, Sept.—Nov.      |               |                  |
| granulata L. . . . .                            | 3             | —                |
| — fl. pleno . . . . .                           | 5             | 1 —              |
| Crassifolia L. . . . .                          | —             | 4 —              |
| purpurescens . . . . .                          | —             | 10 —             |
| racemosa W. . . . .                             | —             | 7 —              |
| <b>Schizostylis</b> , Irideae,                  |               |                  |
| coccinea Backh. . . . .                         | 5             | 1 —              |

**Scilla, Liliaceae, Aug.—Nov.**

|                            | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|----------------------------|---------------|------------------|
| alpina Schott. . . . .     | 30            | 5 —              |
| amonea L. . . . .          | 35            | 6 —              |
| autumnalis L. . . . .      | 18            | 3 —              |
| bifolia L. . . . .         | 5             | 1 —              |
| campanulata Ait. . . . .   | 4             | — 75             |
| — fl. albo . . . . .       | 5             | 1 —              |
| — fl. roseo . . . . .      | 6             | 1 —              |
| cernua Red. . . . .        | 5             | 1 —              |
| ciliata L. . . . .         | —             | — 15             |
| cilicica Schott. . . . .   | —             | — 12             |
| Clusii Bert. . . . .       | —             | — 10             |
| italica L. . . . .         | 30            | 5 —              |
| japonica Thunb. . . . .    | 12            | 1 50             |
| * Kladnii Schur. . . . .   | 20            | 3 —              |
| monophylla Ledeb. . . . .  | 30            | 5 —              |
| nivalis L. p. . . . .      | 25            | 4 —              |
| nutans Desf. . . . .       | 5             | 1 —              |
| patula Beaum. . . . .      | 5             | 1 —              |
| praecox L. . . . .         | 20            | 3 —              |
| pratensis W. et K. . . . . | 10            | 1 25             |
| puschkinoides Rgl. . . . . | 90            | 5 —              |
| sibirica L. . . . .        | 5             | 1 —              |
| taurica Schott. . . . .    | 30            | 5 —              |
| verna Huds. . . . .        | —             | 10 —             |

**Scopolina, Solaneae, Oct.—April.**

|                               |    |     |
|-------------------------------|----|-----|
| * carniolica Rechb. . . . .   | 20 | 3 — |
| * Hiadnickiana Frey . . . . . | 30 | 5 — |

**Sisyrhinchium, Iridae, Oct.—April.**

|                              |    |      |
|------------------------------|----|------|
| anceps Lam. . . . .          | 40 | 7 50 |
| Bermudianum Bess. . . . .    | 50 | 8 —  |
| chilense Hook. . . . .       | —  | —    |
| convolutum Nocca . . . . .   | 50 | 8 —  |
| Engelmanni Rgl. . . . .      | 50 | 8 —  |
| grandiflorum L. . . . .      | 50 | 8 —  |
| iridifolium H. B. . . . .    | 50 | 8 —  |
| Nuttali Sw. . . . .          | 50 | 8 —  |
| odoratissimum Lindl. . . . . | —  | 12 — |
| reticulatum Quor. . . . .    | 50 | 8 —  |
| strictum Sw. . . . .         | 50 | 8 —  |
| sulphureum . . . . .         | 50 | 8 —  |
| tenuifolium H. B. . . . .    | —  | 12 — |

**Smilacina, Liliac.-Aspar.,**

|                       |   |     |
|-----------------------|---|-----|
| bifolia Desf. . . . . | 5 | 1 — |
|-----------------------|---|-----|

|                                               | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Sparaxis</b> , Irideae, August—Oct.        |               |                  |
| bulbifer. Ker. . . . .                        | —             | 7 —              |
| grandiflora Ker. . . . .                      | —             | 7 —              |
| pulcherrima hort. . . . .                     | 90            | 15 —             |
| tricolor Ker. . . . .                         | 5             | 1 —              |
| <b>Spiraea</b> , Rosaceae, Sept.—Mai.         |               |                  |
| Aruncus L. . . . .                            | 12            | 1 50             |
| filipendula L. . . . .                        | 10            | 1 25             |
| — filicifolia DC. . . . .                     | 25            | 4 —              |
| japonica L. . . . .                           | —             | —                |
| palmata Thunb. . . . .                        | 15            | 2 —              |
| pedata hort. . . . .                          | 70            | 10 —             |
| Ulmaria L. . . . .                            | 10            | 1 25             |
| <b>Sprekelia</b> , Amaryllideae, Nov.—April.  |               |                  |
| formosissima DC. . . . .                      | 20            | 3 —              |
| — glauca hort. . . . .                        | 20            | 3 —              |
| <b>Sternbergia</b> , Amaryllideae, Sept.—Nov. |               |                  |
| aetnensis Ten. . . . .                        | —             | 10 —             |
| colchiciflora W. et K. . . . .                | —             | 10 —             |
| dalmatica R. . . . .                          | 40            | 7 —              |
| lutea Ker. . . . .                            | 5             | 1 —              |
| <b>Symphytum</b> , Boragineae, Sept.—April.   |               |                  |
| cordatum W. et K. . . . .                     | 25            | 4 —              |
| tuberosum L. . . . .                          | 5             | 1 —              |
| <b>Tamus</b> , Smilaceae, Aug.—Nov.           |               |                  |
| communis L. . . . .                           | 25            | 3 50             |
| <b>Tigridia</b> , Irideae, Nov.—Mai.          |               |                  |
| canariensis hort. . . . .                     | 20            | 3 —              |
| coelestis Otto . . . . .                      | 20            | 3 —              |
| conchiflora Sweet. . . . .                    | 18            | 2 50             |
| grandiflora Salisb. . . . .                   | 12            | 1 50             |
| pavonia Pers. . . . .                         | 10            | 1 25             |
| <b>Thalictrum</b> , Ranunculac., Oct.—April.  |               |                  |
| anemonoides Michx. . . . .                    | —             | 9 —              |
| aquilegifolium L. . . . .                     | 12            | 1 50             |
| — fl. albo . . . . .                          | 10            | 1 25             |
| elatum Murr. . . . .                          | 20            | 3 —              |
| flexuosum Bernh. . . . .                      | 12            | 1 50             |
| minus L. . . . .                              | 20            | 3 —              |
| transsylvanicum Schu. . . . .                 | 30            | 5 —              |
| <b>Trichonema</b> , Irideae, Aug.—Nov.        |               |                  |
| Bulbocodium L. . . . .                        | 20            | 3 —              |
| Celsii H. B. . . . .                          | 12            | 1 50             |
| Columnae H. B. . . . .                        | 20            | 3 —              |

|                                                 | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Trichomena.</b>                              |               |                  |
| filifolia Gawl. . . . .                         | 50            | 8 —              |
| minima Ten. . . . .                             | 30            | 4 —              |
| purpurascens Sweet. . . . .                     | 30            | 4 —              |
| ramiflora Eckl. . . . .                         | 12            | 1 50             |
| speciosa hort. . . . .                          | 6             | 1 —              |
| <b>Tricyrtes, Uvularieae, Oct.—April.</b>       |               |                  |
| grandiflora hort. . . . .                       | 18            | 2 50             |
| hirta Wall. . . . .                             | 18            | 2 50             |
| macropoda Miq. . . . .                          | 25            | 3 50             |
| <b>Trillium, Smilacaceae, Aug.—Nov.</b>         |               |                  |
| atropurpureum . . . . .                         | 90            | 15 —             |
| cernuum L. . . . .                              | 80            | 12 —             |
| erectum L. . . . .                              | 90            | 15 —             |
| grandiflorum Pursh. . . . .                     | 35            | 4 50             |
| ovatum Pursh. . . . .                           | 90            | 15 —             |
| pendulum Wild. . . . .                          | 70            | 10 —             |
| sessile L. . . . .                              | 20            | 3 —              |
| <b>Triteleia, Liliac.-Asphod., Aug.—Nov.</b>    |               |                  |
| alliacea hort. . . . .                          | 18            | 2 50             |
| ixioides hort. . . . .                          | 50            | 8 —              |
| laxa Benth. . . . .                             | 40            | 6 —              |
| longipes hort. . . . .                          | 50            | 8 —              |
| parrifolia Poepp. . . . .                       | 20            | 3 —              |
| uniflora Lindl. . . . .                         | 5             | — 80             |
| <b>Tritoma, (Knip.), Lil.-Hemeroc., Herbst.</b> |               |                  |
| crispa Ker. . . . .                             | 50            | 8 —              |
| crocata Ker. . . . .                            | 12            | 1 50             |
| longiflora Ker. . . . .                         | 12            | 1 50             |
| scularis hort. . . . .                          | —             | 8 —              |
| <b>Trollius, Ranunculaceae, Oct.—April.</b>     |               |                  |
| altaicus C. A. Mey. . . . .                     | 20            | 3 —              |
| altissimus Crntz. . . . .                       | 10            | 1 20             |
| asiaticus L. . . . .                            | 15            | 1 50             |
| dschungaricus Rgl. . . . .                      | 30            | 4 —              |
| europaeus L. . . . .                            | 10            | 1 25             |
| humilis Crntz. . . . .                          | 12            | 1 50             |
| Ledebouri Rchb. . . . .                         | 25            | 3 50             |
| patulus Salisb. . . . .                         | 20            | 3 —              |
| <b>Tulipa, Liliac.-Tulipeae, Aug.—Nov.</b>      |               |                  |
| Aquitonica L. . . . .                           | —             | 6 —              |
| Batalini Rgl. . . . .                           | —             | 15 —             |
| Biebersteiniana Rgl. . . . .                    | —             | 7 —              |
| biflora L. . . . .                              | —             | 6 —              |

**Tulipa.**

|                                                | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Gesneriana L. . . . .                          | 6             | —                |
| carinata Pers. rubra. . . . .                  | 6             | 1 —              |
| Celsiana Red. . . . .                          | 10            | 1 25             |
| Clusiana L. . . . .                            | 20            | 3 —              |
| Didierii Rgl. . . . .                          | 12            | 1 50             |
| Eichleri Rgl. . . . .                          | —             | 30 —             |
| elegans M. B. . . . .                          | 15            | 2 —              |
| fulgens Fisch. . . . .                         | 12            | 1 25             |
| gallica Rchb. . . . .                          | —             | 12 —             |
| Grayggi Rgl. . . . .                           | 50            | 7 —              |
| Grisebachiana Pantoc. . . . .                  | —             | 18 —             |
| Haageri Rgl. . . . .                           | 20            | 3 —              |
| hexagonata Borb. . . . .                       | —             | 18 —             |
| Kolpakowskyana Rgl. . . . .                    | —             | 15 —             |
| Korolkakowi Rgl. . . . .                       | —             | 16 —             |
| lanata Rgl. . . . .                            | —             | 12 —             |
| macrospila Bak. . . . .                        | 30            | 3 50             |
| Maximowiczi Rgl. . . . .                       | —             | 12 —             |
| montana Lindl. . . . .                         | —             | 25 —             |
| narbonensis hort. . . . .                      | —             | 25 —             |
| neglecta Rchb. . . . .                         | —             | 20 —             |
| oculus Solis L. . . . .                        | 12            | 1 50             |
| Ostrowskiana Rgl. . . . .                      | —             | 16 —             |
| persica Clus. . . . .                          | 6             | 1 —              |
| praecox Clus. . . . .                          | —             | 20 —             |
| Raddi Rchb. . . . .                            | —             | 20 —             |
| Reichenbachiana Borb. . . . .                  | 20            | 3 —              |
| saxatilis Rgl. . . . .                         | 20            | 3 —              |
| strangulata Rchb. . . . .                      | —             | 25 —             |
| sylvestris L. . . . .                          | 12            | 1 50             |
| Tenori Rchb. . . . .                           | —             | 30 —             |
| tricolor Ledb. . . . .                         | 30            | 4 —              |
| triphylla Rgl. . . . .                         | 40            | 6 50             |
| turkestanica Rgl. . . . .                      | —             | 10 —             |
| virediflora hort. . . . .                      | —             | 10 —             |
| <b>Umbilicus</b> , Crassulaceae, Sept.—Nov.    |               |                  |
| horizontalis DC. . . . .                       | 20            | 3 —              |
| pendulinus DC. . . . .                         | 12            | 1 50             |
| <b>Uropetalum</b> , Liliac.-Asphod., Aug.-Nov. |               |                  |
| serotinum Ker. . . . .                         | 18            | 2 50             |
| viride K. . . . .                              | 12            | 1 50             |
| <b>Uvaria</b> , Liliac.-Hemerocal., Oct.-Apr.  |               |                  |
| aloides Mönch. . . . .                         | 10            | 1 25             |

**Uvaria.**

|                            | 100 St.<br>M. | 12 St.<br>M. dl. |
|----------------------------|---------------|------------------|
| angustifolia hort. . . . . | 50            | 7 —              |
| gigantea Wall. . . . .     | —             | 12 —             |
| glaucescens hort. . . . .  | 18            | 3 —              |
| grandiflora Roxb. . . . .  | 10            | 1 50             |

**Uvularia, Uvularieae, Oct.—April.**

|                            |    |     |
|----------------------------|----|-----|
| grandiflora Smith. . . . . | 50 | 7 — |
| perfoliata L. . . . .      | 50 | —   |

**Veratrum, Colchicaceae, Sept.—April.**

|                            |    |      |
|----------------------------|----|------|
| album L. . . . .           | 20 | 3 —  |
| Lobellianum Bernh. . . . . | 15 | 2 50 |
| nigrum L. . . . .          | 30 | 5 —  |

**Zephyranthes, Amaryllideae, Sept.—Nov.**

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| atamasco Herb. . . . .   | 5 | —   |
| cardida Herb. . . . .    | 5 | —   |
| carinata Herb. . . . .   | — | 3 — |
| ochroleuca Herb. . . . . | — | 6 — |
| rosea Lindl. . . . .     | — | 6 — |
| sulphurea hort. . . . .  | — | —   |

**Muster-Kisten** mit 500 Blumenzwiebeln zum Preise von 20 Reichsmark und Porto. — Siehe besondere Offerte.

**Colis postaux pour l' étranger.**

1. pour les paquets jusqu'à 3 Chil. de poid:

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Bulgarie . . . St.                   | 1.75 = fl. —.88     |
| France . . . Fr.                     | 1.50 = fl. —.75     |
| Grande Bretagne<br>et l'Irlande void |                     |
| Hambourg shil.                       | 2. — = fl. 1.18     |
| Italie . . . Fr.                     | 1.25 = fl. —.63     |
| Norwège . . Kr.                      | 1.35 = fl. —.88     |
| Servie . . . Dr.                     | 1.25 = fl. —.63     |
| Hispagne . Pes.                      | 2.25 = fl. 1.13     |
| Suède . . . Kr.                      | 2.50 = fl. 1.25     |
| Roumanie . Fr.                       | 1.25 = fl. —.63     |
| Turqui (Constantinople)              |                     |
|                                      | Fr. 2.25 = fl. 1.13 |

2. pour les paquets 5 Chil. de poid:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Allemagne . . M.     | 0.50 = 30 kr.  |
| Autriche-Hongroie    | 30 kr.         |
| Belgique . . Fr.     | 1.50 = 75 kr.  |
| Danemark . Kr.       | 1.35 = 75 kr.  |
| Grèce. . . . Dr.     | 1.75 = 88 kr.  |
| Grande Bretagne      | 3/ = fl. 1.68  |
| Ecosso et Ir-        |                |
| lande . . . . .      | 3/7 = fl. 2. — |
| Pay bas. . . . Fl.   | — .75 = 75 kr. |
| Montenegro . . . . . | — .40 kr.      |
| Suisse . . . . . Fr. | — 1. = 50 kr.  |

**Spediteur:** Jahnel & Rustia, Triest, Karesch & Stotzky, Bremen.

**Banquier:** Menner & Nagel's Nachfolger, Klagenfurt.



*Nerine sarniensis* Herb. à Stück M. 1.25.

## H. Gusmus, Klagenfurt, Oesterreich

empfiehlt **Musterkisten**, enthaltend: 500 Blumenzwiebeln zu folgenden Bedingungen:

1. der **Betrag** von Reichsmark 20 = ö. W. fl. 12 = Fr. 25 (Porto nicht eingerechnet) muss vorhinein eingesandt werden;
2. alle **Wünsche** in Betreff **Aenderung** des **Inhaltes** können nicht berücksichtigt werden;
3. **Verpackung** wird nicht berechnet;
4. die **Versendung** findet statt vom 15. August bis 15. Sept.;
5. **halbe Kisten** werden zum halben Preise geliefert;
6. eine ganze Musterkiste enthält:

20 Hiacynthen, 10 einfache, 10 gefüllte, je 5 Farben.  
20 Tulpen, 10 einfache, 10 gefüllte.  
20 Narcissen, 10 einfache, 10 gefüllte.  
20 Crocus, 5 gelbe, 5 weisse, 5 blaue, 5 gestreifte.  
20 Anemonen, 10 einfache, 10 gefüllte.  
20 Ranunculus, verschiedene Arten gefüllte und einfache.  
20 Lilium, 10 carniolicum, 10 dalmaticum.  
20 Allium, 10 neapolitanum, 10 roseum.  
20 Chionodoxa, 10 Luciliae, 10 sardensis.  
20 Colchicum, 10 arenarium, 10 montanum.  
20 Erythronium denscanis, 2 Varietäten.  
20 Freesia, 10 Leichtlinii, 10 refracta.  
20 Galanthus, 10 Elwesii, 10 nivalis.  
20 Gladiolus, 10 palustris, 10 segetum.  
20 Hiacynthus, 10 leucophaeus, 10 nivalis.  
20 Leucoium, 10 vernum, 10 aestivale.  
20 Iris tuberosa Varietäten.  
20 Muscary, 10 comosum, 10 racemosum.  
20 Ornithogalum, 10 pyrenaicum, 10 umbellatum.  
20 Pancratium, 10 illyricum, 10 maritimum.  
20 Romulea, 10 Bulbocodium, 10 roseum.  
20 Scilla, 10 campanulata, 10 sibirica.  
20 Tritelaya, 10 uniflora, 10 diverse.  
20 Sternbergia, 10 dalmatica, 10 lutea.  
20 Zephgranthes, 10 Atamasco, 10 candida etc.

---

Unter **denselben** Bedingungen, jedoch nur für die Zeit vom 15. September bis 15. October 500 **Knollen- und Wurzelgewächse**.

- 20 Aconitum, 10 Anthora, 10 Napellus.
- 20 Adonis vernalis Varietäten.
- 20 Anemone, 10 apennina, 10 trifolia.
- 20 Arum, 10 italicum, 10 tenuifolium.
- 20 Convallaria, 10 majalis, 10 div.
- 20 Corydalis, 10 cava, 10 solida.
- 20 Cyclamen, 10 graecum, 10 repandum.
- 20 Dentaria, 10 eneaphyllos, 10 digitata.
- 20 Eranthis, 10 hyemalis, 10 Sanicula europaea.
- 20 Hacquetia epipactys (schöne Frühlingsblume).
- 20 Helleborus, 10 niger, 10 viridis Varietäten.
- 20 Hepatica, 10 angulosa, 10 triloba alba.
- 20 Iris, 10 caespitosa, 10 pumila Varietäten.
- 20 Isopyrum cholictroides, schön, weiss.
- 20 Omphalodes verna (blau, schön).
- 20 Paeonia, 10 pubens, 10 tenuifolia.
- 20 Paradisia, 10 Liliastrum, 10 (Anth.) graminifolia.
- 20 Polygonatum, 10 mulliflorum, 10 vulgare.
- 20 Ranunculus aconitifolius, 10 carpathicus.
- 20 Smilacina, 10 bifolia, 10 (Flüggea) japonica.
- 20 Soldanella, 10 alpina, 10 montana.
- 20 Symphitum, 10 cordatum, 10 tuberosum.
- 20 Thalyctrum, 10 aquilegiaefolium, 10 minus.
- 20 Valeriana, 10 montana, 10 tripteris.
- 20 Veratrum, 10 album, 10 viride.

NB. Eine ganze Kiste Blumenzwiebeln wiegt circa 10 Kilog., eine dito Knollen etc. gleichfalls 10 Kilog.

100 Arten **Blumenzwiebeln**, die schönsten und seltensten à 5 Stück kosten incl. Packung Rehm. 40.

25 Arten **Erd-Orchideen**, von jeder 5 Stück Knollen oder Rhizome, keine gewöhnliche, für RM. 10 bis RM. 50.

25 Arten **Alpenpflanzen**, nur die schönsten und seltensten, stärkste Exemplare, à 5 Stück RM. 10 bis RM. 20.

Es bedarf wohl keiner näheren Erklärung, dass ich alles aufbieten werde, das entgegengebrachte Vertrauen zu rechtfertigen und gewiss Jeder mit Musterkisten zufrieden sein wird.

---



Gusman.